

30 KG / 10 AÑOS

SSF: suero salino fisiológico. a.p.i: agua para inyección.
 PCR: parada cardiorrespiratoria. GS 5%: suero glucosado al 5%.

PRINCIPIO ACTIVO	N. COMERCIAL	ADMINISTRACIÓN	DOSIS (ml)	DOSIS (mg) DOSIS/kg	DOSIS MÁXIMA OBSERVACIONES
Adenosina	Adenocor 6 mg/2 ml	Bolo rápido IV 1-2 segundos seguido de inyección de 5 ml de SSF. Si es necesaria 2.ª dosis o sucesivas: 0,2 mg/kg	1 ml	3 mg 0,1 mg/kg	Máximo 6 mg (2 ml) 1.ª dosis Dosis posteriores dosis máxima: 12 mg (4 ml)
Adrenalina en PCR	Adrenalina 1: 1000 1 mg/1 ml	Diluir 1 ampolla de adrenalina 1:1000 (1 ml) en 9 ml de SSF Administración directa IV	3 ml de la dilución	0,3 mg 0,01 mg/kg	1 mg/dosis (10 ml de la dilución) Dosis endotraqueal en PCR: 10 veces mayor (0,1 ml/kg sin diluir)
Adrenalina en anafilaxia	Adrenalina 1: 1000 1 mg/1 ml	Administración IM sin diluir	0,3 ml	0,3 mg 0,01 mg/kg	0,3 mg/dosis (0,3 ml)
Amiodarona	Trangorex 150 mg/3 ml	Fibrilación Ventricular y Taquicardia Ventricular sin pulso: diluir los 3 ml hasta 10 ml de SG 5% y pasar en 3-5 minutos IV. Pacientes con pulso: diluir los 3 ml hasta 250 ml de SG 5% y pasar en 10-20 minutos IV	3 ml	150 mg 5 mg/kg	300 mg/dosis (6 ml) Se puede repetir cada 15 minutos Dosis máxima acumulativa 15 mg/kg
Atropina	Atropina 1 mg/1 ml	Administración IV directa. Puede repetirse a los 5 minutos	0,5 ml	0,5 mg	Dosis mínima 0,1 mg/dosis (0,1 ml). Dosis máxima 0,5 mg (0,5 ml) niños, 1 mg (1 ml) adolescentes. Dosis máxima total 1 mg (1 ml) niños, 2 mg (2 ml) adolescentes 100 mEq/dosis (200 ml de la dilución)
Bicarbonato sódico	Bicarbonato sódico 1 M 10 mEq/10 ml	Diluir al ½ (1:1): 5 ml de bicarbonato sódico 1 M + 5 ml de SSF (1 ml-0,5 mEq). Administrar IV a velocidad NO superior a 10 ml/min (10 minutos) excepto si PCR	60 ml de la dilución	30 mEq 1 mEq/kg	
Ceftriaxona	Ceftriaxona 1 g	Administración IV directa en 2-4 minutos		1500 mg 50 mg/kg	2000 mg/dosis
Cloruro mórfico	Morfina Clorhidrato 1% 10 mg/1 ml	Diluir los 0,3 ml en 10 ml de SSF. Administración IV en 5-10 minutos	0,3 ml	3 mg 0,1 mg/kg	15 mg/dosis (1,5 ml)
Cloruro cálcico	Cloruro cálcico 10% 1 g/10 ml	Diluir al ½ (1:1): 5 ml de Cloruro cálcico 10% + 5 ml de SSF (1 ml-50 mg). Administración IV en 10-20 segundos, en PCR	10 ml de la dilución	500 mg	500 mg/dosis (10 ml de la dilución) Se puede repetir cada 10 minutos hasta dosis total máxima acumulativa 1 g (20 ml de la dilución)
Dexclorfeniramina	Polaramine 5 mg/1 ml	Administración IV directa, lenta	1 ml	5 mg	5 mg/dosis (1 ml)
Diazepam	Valium 10 mg/2 ml	Diluir 2 ml de Valium con 8 ml de SSF o a.p.i. (1 ml-1 mg). Administración IV en 3-5 minutos	9 ml de la dilución	9 mg 0,3 mg/kg	10 mg/dosis (10 ml de la dilución)
Etomidato	Hypnomidate 20 mg/10 ml	Administración directa en 30-60 segundos	4,5 ml	9 mg 0,2-0,3 mg/kg	
Fenitoina	Fenitoina 250 mg/5 ml	Diluir los 12 ml en 100 ml de SSF Ritmo de infusión: pasar en 20 minutos IV	12 ml	600 mg 20 mg/kg	1000 mg/dosis (20 ml)
Fenobarbital	Luminal 200 mg/1 ml	Diluir los 3 ml en 10 ml de a.p.i. Ritmo de infusión: pasar en 20 minutos IV	3 ml	600 mg 20 mg/kg	40 mg/kg: 1200 mg (6 ml)
Fentanilo	Fentanest 0,15 mg/3 ml	Diluir los 0,6 ml en 10 ml de SSF. Administración IV en 3-5 minutos. Se puede repetir cada 30-60 minutos	0,6 ml	30 µg 1-5 µg/kg	Dosis máxima única 50 µg (1 ml) Dosis máxima acumulada 100 µg (2 ml)
Flumazenil	Flumazenilo 0,5 mg/5 ml	Administración IV directa en 15-30 segundos. Se puede repetir cada minuto	3 ml	0,3 mg 0,01 mg/kg	Dosis máxima 0,5 mg (5 ml) Dosis máxima acumulada 1 mg (10 ml)

30 KG / 10 AÑOS

SSF: suero salino fisiológico. a.p.i: agua para inyección.
PCR: parada cardiorrespiratoria. GS 5%: suero glucosado al 5%.

PRINCIPIO ACTIVO	N. COMERCIAL	ADMINISTRACIÓN	DOSIS (ml)	DOSIS (mg) DOSIS/kg	DOSIS MÁXIMA OBSERVACIONES
Furosemida	Furosemida 20 mg-2 ml	Administrar IV en 1-2 minutos	3 ml	30 mg 1-2 mg/kg	40 mg/dosis (4 ml)
Hidralazina	Hidrapres 20 mg/1 ml	Diluir los 0,3 ml en 5 ml de SSF. Administrar IV lento a velocidad máxima de 0,2 mg/kg/min	0,3 ml	6 mg 0,2-0,8 mg/kg	20 mg/dosis (1 ml)
Hidrocortisona	Actocortina 100 mg	Reconstituir con 2 ml de SSF o a.p.i. (1 ml-50 mg) Administración IV en 3-5 minutos	3 ml de la dilución	150 mg 5-10 mg/kg	250 mg/dosis (5 ml de la dilución)
Labetalol	Trandate 100 mg/20 ml	Diluir los 1,2 ml en 5 ml de SSF. Administrar IV en 5-10 minutos	1,2 ml	6 mg 0,2-2 mg/kg	300 mg/dosis (60 ml)
Levetiracetam	Keppra 500 mg/5 ml	Diluir los 9 ml en 10 ml de SSF o a.p.i. Administrar IV en 10 minutos	9 ml	900 mg 30 mg/kg	1500 mg/dosis (15 ml)
Lidocaína	Lidocaína 1% 10 mg/1 ml	Administración directa IV, se puede repetir en 10-15 minutos	3 ml	30 mg 1 mg/kg	Dosis máxima: 100 mg/dosis (10 ml) Dosis máxima total 3 mg/kg en 1.ª hora (0,3-0,5 ml/kg)
Midazolam IV	Midazolam 5 mg/1 ml	Diluir 2 ml de Midazolam con 8 ml de SSF (1 ml-1 mg). Administración IV en 2-3 minutos	6 ml de la dilución	6 mg 0,2-0,3 mg/kg	10 mg/dosis (10 ml de la dilución)
Manitol	Manitol 20% 20 g/100 ml	Administrar IV en 20 minutos	40 ml	7,5 g 0,25-0,5 g/kg	
Metilprednisolona	Urbason	Administrar IV directo en 2-3 minutos		60 mg 2 mg/kg	60 mg/dosis
Na Cl 3%	Na Cl 3%	Mezclar 89 ml de SSF + 11 ml de ClNa al 20% Administrar IV en 5-10 minutos	90 ml	3 ml/kg	
Naloxona	Naloxona 0,4 mg/1 ml	Administración directa IV, IM, SC, ET en 30 segundos. Se puede repetir cada 2-3 minutos vía IV y cada 10 minutos vía IM	5 ml	2 mg	Máximo 2 mg/dosis (5 ml) Dosis máxima acumulativa 10 mg (25 ml)
Propofol	Propofol 1% 10 mg/1 ml	Administración IV directa en 20-30 segundos	3 ml	30 mg 1-3 mg/kg	100 mg/dosis (10 ml)
Rocuronio	Esmeron 10 mg/1 ml	Administración IV directa 30 segundos. Se puede repetir cada 20-30 minutos a 0,2 mg/kg	1,8 ml	18 mg 0,6-1 mg/kg	
Succinil-colina	Anectine 100 mg/2 ml	Administración IV directa 10-30 segundos	0,6 ml	30 mg 1-2 mg/kg	150 mg/dosis (3 ml)
Sulfato de magnesio	Sulfate magnesium 15% (1,5 g/10 ml)	Diluir los 10 ml en 50 ml de SSF y administrar IV en 20-30 minutos (no superar 150 mg/minuto)	10 ml	1500 mg 50 mg/kg	2000 mg/dosis (13 ml)
Tiopental	Tiobarbital 0,5 g	Reconstituir con 10 ml de a.p.i. o SSF (1 ml-50 mg) Administración IV ritmo 25 mg/min (0,5 ml/min)	1,8 ml de la dilución	90 mg 3-5 mg/kg	
Valproico	Depakine 400 mg	Reconstituir con 4 ml de a.p.i. (1 ml-100 mg) Administración IV en 5 minutos	6 ml de la dilución	600 mg 20 mg/kg	800 mg/dosis (8 ml)
Vecuronio	Norcurom 10 mg	Se diluye 10 mg en 10 ml de a.p.i. o SSF (1 ml -1 mg). Administración IV rápida	3 ml de la dilución	3 mg 0,1 mg/kg	5 mg/dosis (5 ml de la dilución)